

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
با سلام و احترام

با توجه به چند مورد گزارش مرگ مادر به دنبال تجویز اشتباه از پروستاگلاندین (در درمان خونریزی پس از زایمان یا شوک هیپوولمیک) به اطلاع می رسد که طبق منابع مبتنی بر شواهد، آمپول Alprostadil (از اشکال Prostaglandin) هیچگونه جایگاهی در درمان خونریزی پس از زایمان و سایر مسایل مامایی ندارد. از عوارض جانبی آن افت فشار خون و سنکوپ به دنبال گشاد شدن عروق می باشد که می تواند در مرگ مادر موثر باشد. ضمناً به منظور پیشگیری از بروز اشتباه هنگام درمان عوارض و بخصوص خونریزیهای مامایی، توجه کلیه مسئولین، متخصصین، پزشکان، ماماها و سایر مراقبین مادر به نکات زیر جلب می شود:

- درمان خونریزی پس از زایمان در "راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان" ذکر شده است
 - هنگام تجویز هر یک از داروها باید به اندیکاسیون ها و موارد منع مصرف توجه شود
 - در صورت تجویز هر یک از داروها بخصوص اشکال پروستاگلاندین توسط پزشک متخصص، حتماً باید نوع، نحوه مصرف و دوز دارو مشخص گردد
 - هنگام استفاده هر یک از داروها بخصوص اشکال پروستاگلاندین به دقت برچسب روی دارو مطالعه شده و با دستور پزشک مطابقت داده شود
- نکات زیر در مورد کلیه داروها مورد تاکید قرار می گیرد:
- هنگام درخواست و خرید از شرکتهای دارویی به اسامی (ژنریک و تجاری) داروها توجه شود
 - هنگام تحویل دارو به بخش و جایگذاری در قفسه یا ترالی به اسامی داروها توجه شود
- خواهشمند است دستور فرمایید بخشنامه فوق به کلیه مراکز و واحدهای درمانی که خدمات مامایی و زایمان را ارائه می نمایند ارسال گردیده و اجرای آن در نظارتها مورد بازدید قرار گیرد.

دکتر محمد اسماعیل مطلق
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

