



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

مایتنتان

Macitentan

(نسخه دوم)

پاییز ۱۴۰۲

تنظیم و تدوین اولیه :

دکتر نوحی دبیر محترم بورد رشته تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مدقق دبیر محترم بورد رشته فوق تخصصی جراح عروق

دکتر سروش رییس انجمن علمی روماتولوژی ایران

دکتر صبری دبیر بورد رشته فوق تخصصی قلب کودکان

دکتر قانع دبیر بورد رشته فوق تخصصی بیماری های ریه

دکتر اشرف زاده دبیر بورد رشته تخصصی کودکان

دکتر طباطبایی دبیر بورد رشته فوق تخصصی ریه کودکان

دکتر شیاری دبیر بورد رشته فوق تخصصی روماتولوژی کودکان

دکتر جمشیدی دبیر بورد رشته فوق تخصصی روماتولوژی بزرگسالان

سرکار خانم دکتر حقیقی فوق تخصص روماتولوژی بزرگسال

دکتر صالحی فوق تخصص روماتولوژی کودکان

دکتر فرشید رشیدی فوق تخصص ریه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر نادری رییس بخش نارسایی قلب مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

نابیدیه نهایی:

دکتر سعید کریمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون محترم درمان

مشاور: دکتر ساناز بخشنده رییس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت



بسمه تعالی
راهنمای تجویز دارو

شرایط تجویز	دوز و توأثر مصرف دارو	اندىكاسيون	منع مصرف	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
در درمان همزمان با داروهای دیگر تنظیم دوز صورت بگیرد؛ تداخلات دارویی مهمی وجود دارد که نیاز به تنظیم دوز/توآثر تجویز دارد یا منع تجویز دارد.	در بزرگسالان: ۱۰ mg روزانه خوراکی، ماکزیمم دوز روزانه ۱۰ mg	پرفشاری شریان ریوی (PAH): ۱- پرفشاری شریان ریوی (ایدیوپاتی، ارثی، جهش BMR2) پرفشاری شریان ریوی ثانویه به داروها بدون بیماری همراه قلبی و ریوی، فشار خون ریوی پورتوپولموناری، بیماری های مادرزادی قلبی (PDA، VSD، ASD)، بیماری های بافت همبند ۲- فشار خون شریان ریوی ثانویه به ترومبوزهای مزمن که قابل جراحی نیستند و با فشار خون ریوی که بعد از جراحی افت قابل توجه نداشته است.	تاریخچه حساسیت شدید به این دارو یا اجزای فرمولاسیون آن حاملگی و شیردهی نارسایی شدید کبدی PVOD- (بیماری انسداد وریدی ریبه)	متخصص قلب و عروق بزرگسالان فوق تخصص روماتولوژی بزرگسالان فوق تخصص ریبه بزرگسال جراح عروق	سریابی بستری	ماسیتینان خوراکی: قرص ۱۰ mg

شرایط تجویز	دوز و تواتر مصرف دارو	انذیکاسیون	منع مصرف	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
		<p>** در پوLMوناری هیپرتشن کلاس ۳ دادن وازودیلاتورها باعث V/Qmissmatch بیشتر میشود و به صورت کلاسیک توصیه نمی شود.</p>				

- **اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو (اقدامات پاراکلینیک و ...)**
- علائم ادم محیطی پایش شود و در صورت بروز علت آن ارزیابی گردد.
- قبل از شروع درمان، آنزیم های کبدی اندازه گیری و متناسب با شرایط بالینی بیمار تکرار شود. علائم و نشانه های بالینی آسیب کبدی (مانند درد شکمی، بی اشتها، ادرار تیره، خستگی، تب، خارش، یرقان، تهوع، استفراغ) را کنترل کنید.
- قبل از شروع درمان، هموگلوبین و هماتوکریت اندازه گیری شود و متناسب با شرایط بالینی بیمار تکرار شود.

- **توصیه ها:**
- اکوکاردیوگرافی، تستهای عملکرد ریوی، کاترئیزاسیون راست و تعیین نوع هیپرتانسیون پوLMونر، چک CBC، Cr، LFT، تست بارداری (در زنان با پتانسیل بارداری، قبل از شروع درمان، همراه در طول درمان، و یک ماه بعد از قطع درمان).

- اسکن پرفیوژن ریه ها بر حسب نظر پزشک معالج
- تجویز دارو باید پس از تشخیص قطعی فشار خون ریوی و تعیین نوع آن با تست های تشخیصی مربوطه از جمله اکوکاردیوگرافی و کاتتریزاسیون قلب راست صورت گیرد.
- در خانمهای مبتلا به هیپرتانسیون پولمونر بارداری ممنوع است و باید روش های پیشگیری مطمئن در این بیماران استفاده شود.
- در صورت بروز علائم ادم ریوی، احتمال PVOD (بیماری انسداد وریدی ریه) را در نظر بگیرید؛ در صورت تایید PVOD، دارو را متوقف کنید.
- احتباس آب / ادم محیطی: ممکن است به دلیل درمان و/یا وضعیت بیماری (فشار خون شریانی ریوی) ادم محیطی رخ دهد. ممکن است ضروری باشد که بررسی های بیشتری برای تعیین علت و درمان مناسب با آن و یا قطع درمان صورت بگیرد.
- اثرات هماتولوژیک: کاهش هماتوکریت/هموگلوبین مشاهده شده است و ممکن است در اوایل درمان رخ دهد. هموگلوبین را قبل از شروع درمان اندازه گیری کنید و در صورت لزوم تکرار کنید. در بیماران مبتلا به کم خونی شدید توصیه به تجویز نمیشود.
- اثرات کبدی: افزایش آمینوترانسفرازهای کبدی در سرم، سمیت کبدی و نارسایی کبدی گزارش شده است. قبل از شروع درمان ترانس آمیناز ها را اندازه گیری کنید و در صورت لزوم تکرار کنید. در بیمارانی که افزایش ترانس آمیناز ها همراه با علائم آسیب کبدی (مانند بی اشتها، ادرار تیره، خستگی، تب، خارش، پرقان، تهوع، درد ربع فوقانی راست، استفراغ) یا افزایش بیلی روبین است (بیش از دو برابر حد نرمال [ULN]) درمان را قطع کنید. بعد از رسیدن آنزیم های کبدی به حد نرمال، ممکن است در بیمارانی که علائم بالینی سمیت کبدی را تجربه نمیکنند، مجددا درمان را شروع کنید.

• منابع:

- Up to Date
- 2-2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Respir J 2022; in press: 2200879