



پیشگیری از مسمومیت ناشی از زنبورگزیدگی

نیش زنبور عسل ماده، به کیسه محتوی سم متصل است و پس از گزش در زخم باقی می ماند و محتویات کیسه سم به زخم منتقل می شود. علائم زنبورگزیدگی معمولاً در عرض چند ساعت ناپدید می شود.

موارد زیر در زنبورگزیدگی پیشنهاد میشود:

- برداشتن سریع نیش از روی زخم، جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم
- شستشوی محل زنبورگزیدگی با آب و صابون
- کمپرس سرد روی محل گزیدگی و برداشتن آن از روی پوست بطور متوالی هر ۱۵ دقیقه
- از قراردادن مستقیم یخ روی پوست و از گرم کردن موضع بپرهیزید

اگر بیمار مشکل

تنفسی داشت و یا تورم شدید و سریع در محل گزش بروز کرد، باید به پزشک مراجعه نماید.

فرد زنبورگزیده باید برای چند روز از نظر تشدید درد یا باقی ماندن تورم یا علائم شبیه آنفولانزا و تب باید تحت نظر باشد و در صورت بروز این علائم، سریعاً به پزشک مراجعه نماید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت غذا و دارو
مدیریت نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت



برای دیدن تمام موارد آموزشی معاونت غذا و دارو اسکن کنید