



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

بودزنولید استشاقی

Budesonide Inhalation

زمستان ۱۴۰۲

تنظیم و تدوین اولیه :

دکتر سلام زاده دبیر محترم بورد و رئیس انجمن علمی متخصصین داروسازان بالینی کشور

دکتر فرزانه داستان، متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مخدومی دبیر محترم بورد رشته تخصصی داخلی

دکتر اشرف زاده دبیر محترم بورد رشته تخصصی بیماری‌های کودکان

دکتر ارحمنی دبیر محترم بورد رشته تخصصی طب اورژانس

دکتر قانعی دبیر محترم بورد رشته فوق تخصصی ریه

دکتر داوری رئیس انجمن علمی جراحان توراکس ایران

دکتر موحدی دبیر محترم بورد آلرژی و ایمونولوژی بالینی

دکتر توکل فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر هاشمیان جانشین محترم دبیر بورد رشته فوق تخصصی مراقبت ویژه

دکتر طباطبایی دبیر محترم بورد رشته فوق تخصصی ریه کودکان

دکتر کلانتر هرمزی دبیر بورد جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

دکتر علیمردانی متخصص داروسازی بالینی

دکتر اصغرپور داروسازی عمومی

با همکاری:

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو

تحت نظر: دکتر سعید کریمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون محترم درمان

مشاور: دکتر ساناز بخشندۀ رئیس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعریفه سلامت



بسمه تعالیٰ

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	منع مصرف	موارد مصرف	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
بوузوناید	بستری سرپایی	کلیه پزشکان بالینی	-حساسیت به بوузوناید یا هر کدام از فرآورده‌های آن (آنافیلاکسی، آنتیوادم، برونکواسپاسم، راش، درماتیت تماس و کمیر) -حساسیت شدید به پروتئین های شیر -آسم استاتوس و اپیزودهای حاد آسم که نیاز به مراقبت ویژه دارد.	آسم، نگهدارنده/ کنترل کننده	-بزرگسالان: طبق گایدلاین GINA 2023 دوز بوузوناید بر اساس شدت علائم فرد میباشد. بدین صورت که برای آسم پایدار ملایم، اینهالر استنشاقی دوزهای پایین ۴۰۰-۴۰۰ mcg/day، در آسم پایدار متوسط، دوزهای ۲۰۰ ، در آسم پایدار متوسط، دوزهای متوسط ۴۰۰-۸۰۰ mcg/day و در موارد شدید دوزهای بالا، ۸۰۰ mcg/day > .	-دوزهای ≤۴۰۰ mcg/day بصورت یک بار در روز، و >۴۰۰ دوزهای mcg/day بصورت منقسم ۲-۴ بار در روز و البته معمولاً دوبار در روز تجویز میشود. -تیتراسیون: برای بیمارانی که بعد از ۲-۴ هفته علائم به خوبی کنترل نشده است، پس از بررسی های لازم، دوز درمان کنترل کننده افزایش یابد.
انهالر استنشاقی: ۱۰۰ mcg/dose، ۲۰۰ mcg/dose، ۴۰۰ mcg/dose -بنولایزر استنشاقی: ۰,۵ mg/۲mL، ۱ mg/۲mL mcg/ml ۲۵۰			-برونشکنازی متوجه شدید -سل ریوی -عفونت درمان نشده -ریوی(ویروسی، قارچی، باکتریایی)			

شرایط تجویز	دوز و توواتر مصرف دارو	موارد مصرف	منع مصرف	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
در بیمارانی که برای ۳-۶ ماه روی یک رژیم پایدار علائم به خوبی کنترل شده است درمان کنترل کننده میتواند به صورت پلکانی تا رسیدن به حداقل دوز موثر کاهش یابد.	<p>-کودکان:</p> <p>درمان نگهدارنده آسم:</p> <p>در صورت کنترل آسم، دوز دارو باید به حداقل دوز موثر کاهش یابد.</p> <p>*دوزینگ نبولایزر:</p> <p>-در نوزادان بالای ۶ ماه:</p> <p>۰/۲۵ میلی گرم از محلول نبولایزر دو بار در روز یا ۰/۵ میلی گرم یک بار در روز. حداقل دوز روزانه قابل استفاده، ۱ میلی گرم در روز می باشد.</p> <p>-در کودکان دارای علائم که به درمان های غیراستروئیدی آسم پاسخ نداده اند:</p> <p>دوز ابتدایی: ۰/۲۵ میلی گرم از محلول نبولایزر یک بار در روز.</p> <p>-در کودکانی که قبل روى رژيم درمانی برونکودیلاتور تنها بوده اند:</p>		<p>-هرپس چشمی</p> <p>-سرخ</p> <p>-آبله مرغان</p> <p>-بروز</p> <p>پارادوکسیکال حین درمان با بودزناید</p>			

شرایط تجویز	دوز و توواتر مصرف دارو	موارد مصرف	منع مصرف	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
	<p>دوز ابتدایی: ۰/۵ میلی گرم از محلول نبولایزر ۲ بار در روز یا ۰/۵ میلی گرم یک بار در روز. حداکثر دوز روزانه قابل استفاده، ۰/۵ میلی گرم در روز می باشد.</p> <p>-در کودکانی که قبلاً کورتیکواستروئید استنشاقی دریافت کرده اند:</p> <p>دوز ابتدایی: ۰/۵ میلی گرم از محلول نبولایزر ۲ بار در روز یا ۰/۵ میلی گرم یک بار در روز. حداکثر دوز روزانه قابل استفاده، ۱ میلی گرم در روز می باشد.</p> <p>-در کودکانی که قبلاً کورتیکواستروئید سیستمیک دریافت کرده اند:</p> <p>دوز ابتدایی: ۰/۵ میلی گرم از محلول نبولایزر ۲ بار در روز یا ۱ میلی گرم یک بار در روز. حداکثر دوز روزانه قابل استفاده ۱ میلی گرم در روز می باشد.</p>					

شرایط تجویز	دوز و توواتر مصرف دارو	موارد مصرف	منع مصرف	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
	<p>*دوزینگ طبق NIH Asthma Guidelines</p> <p>-در کودکان کمتر از ۴ سال:</p> <p><u> محلول نبولایزر در یک یا دو دوز منقسم.</u></p> <p>دوز کم: ۰/۵ تا ۰/۰ میلی گرم در روز</p> <p>دوز متوسط: ۰/۵ تا ۱ میلی گرم در روز</p> <p>دوز زیاد: بیشتر از ۱ میلی گرم در روز</p> <p>-در کودکان ۵ تا ۱۱ سال:</p> <p>دوز کم: ۰/۵ میلی گرم در روز</p> <p>دوز متوسط: ۱ میلی گرم در روز</p> <p>دوز زیاد: ۲ میلی گرم در روز</p> <p><u> اینهالر در دو دوز منقسم.</u></p> <p>-کودکان ۵ تا ۱۱ سال:</p> <p>دوز کم: ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکروگرم در روز.</p>					

شایط تجویز	دوز و تواتر مصرف دارو	موارد مصرف	منع مصرف	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
	<p>دوز متوسط: ۴۰۰ تا ۸۰۰ میکروگرم در روز.</p> <p>دوز بالا: بیشتر از ۸۰۰ میکروگرم در روز.</p> <p>-کودکان بالای ۱۲ سال و نوجوانان:</p> <p>دوز کم: ۲۰۰ تا ۶۰۰ میکروگرم در روز.</p> <p>دوز متوسط: ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ میکروگرم در روز.</p> <p>دوز بالا: بیشتر از ۱۲۰۰ میکروگرم در روز.</p> <p>*دوزینگ طبق گایدلاین 2023 :</p> <p>الف-نبولايزر:</p> <p>-کودکان ۵ سال و کمتر:</p> <p>دوز "پایین": ۵۰۰ mcg/day</p> <p>-کودکان ۶-۱۱ سال:</p> <p>دوز "پایین": ۵۰۰-۲۵۰ mcg/day</p>					

شرايط تجويز	دوز و توادر مصرف دارو	موارد مصرف	منع مصرف	افراد صاحب صلاحیت جهت تجويز	محل تجويز و کاربرد دارو	نام دارو
	<p>دوز "متوسط" mcg/day:>1000-500</p> <p>دوز "بالا" mcg/day:>1000</p> <p>ب-اینهالر:</p> <p>--کودکان ۱۱-۶ سال:</p> <p>دوز "پایین" ۲۰۰-۱۰۰ mcg/day</p> <p>دوز "متوسط" >۴۰۰-۲۰۰ mcg/day</p> <p>دوز "بالا" >۴۰۰ mcg/day</p> <p>-کودکان ۱۲ سال و بالاتر:</p> <p>دوز "پایین" ۴۰۰-۲۰۰ mcg/day</p> <p>دوز "متوسط" >۸۰۰-۴۰۰ mcg/day</p> <p>دوز "بالا" >۸۰۰ mcg/day</p> <p>• عود خفيف و تشديد آسم:</p>					

شرايط تجویز	دوز و تواتر مصرف دارو	موارد مصرف	منع مصرف	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
	<p>در کودکان بزرگتر از ۱۲ سال و نوجوانان با آسم خفیف تا متوسط که تا کنون حملات تشدید تهدید کننده حیات را تجربه نکرده اند و مهارت خوبی در کنترل آسم خود دارند پیشنهاد می شود، که به محض مشاهده عود خفیف بیماری، به صورت موقت دوز کورتیکواستروئید استنشاقی آنها ۴ برابر شود، تا شدت حملات تشدید آسم در آنها تخفیف یابد. بعد از پایدار شدن علائم یا حداکثر دریافت ۱۴ روز از دوز چهار برابر شده (هر کدام زودتر رخ دهد) درمان به دوز اولیه خود باز می گردد.</p>					

- اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو (اقدامات پاراکلینیک و ...)

• عوامل پایش:

✓	¹ FEV1
✓	Peak flow
✓	تست های عملکرد ریوی
✓	تراکم استخوان
✓	معیارهای رشد در کودکان و نوجوانان
✓	بررسی سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال و نارسایی آدرنال
✓	گرانولوماتوز ائوژینوفیلی همراه با پلی آنژیت
✓	narzayi kbd
✓	علائم کاندیدیازیس دهانی
✓	علائم آسم
✓	گلوکوم یا کاتاراکت
✓	بررسی سابقه حساسیت بیمار
✓	نقص ایمنی و وجود عفونت

• توصیه ها:

- نکات احتیاطی در رابطه با بیماری ها و عوارض جانبی دارو:
 - ✓ کورتیکواستروئید های استنشاقی می توانند باعث کاهش سرعت رشد در کودکان شوند، لذا میزان دوز و دوره مصرف بسیار حائز اهمیت است و باید به حداقل دوز موثر کاهش یابد.
 - ✓ در استفاده از برونکودیلاتور های استنشاقی ممکن است برونکواسپاسم پارادوکسیکال رخ دهد که در این موقع تشخیص افتراقی این عارضه با کافی بودن یا نبودن پاسخ به درمان، باید مد نظر قرار گیرد. در صورت تایید عارضه برونکواسپاسم پارادوکسیکال، درمان فوراً قطع شود و درمان جایگزین در نظر گرفته شود.
 - ✓ مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئید ها می تواند باعث افزایش احتمال بروز عفونت های ثانویه، پوشاندن عفونت های حاد (از جمله عفونت های قارچی) و تشدید یا افزایش طول دوره عفونت های ویروسی یا کاهش پاسخ به واکسن ها شود.

¹Forced Expiratory Volume

- ✓ در مصرف طولانی مدت کورتیکواسترۆئید ها به دلیل سرکوب سیستم ایمنی، باید از نزدیک شدن به افراد مبتلا به آبله مرغان و سرخک اجتناب شود. در صورت تماس فرد با مبتلایان، پروفیلاکسی با ایمونوگلوبولین واریسلا زوستر و ایمونوگلوبولین سرخک به ترتیب، صورت گیرد و اگر بیماری آبله مرغان ایجاد شد، از داروی ضد ویروس مناسب برای درمان استفاده شود.
- ✓ از مصرف کورتیکواسترۆئید ها در عفونت های سیستمیک باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی درمان نشده و همچنین در هر پس چشمی و سل ریوی نهفته یا فعال باید اجتناب شود.
- ✓ هایپرکورتیزولیسم و یا سرکوب محور هیپوتalamوس-هیپوفیز-آدرنال می تواند در کودکان و افراد دریافت کننده دوز بالای کورتیکواسترۆئید (بیشتر از ۲۰ میلی گرم پر دنیزون یا معادل آن در روز) و درمان های طولانی مدت رخ دهد.
- ✓ باید از قطع ناگهانی کورتیکواسترۆئید ها اجتناب ورزید و در صورت تغییر آنها از فرم سیستمیک به استنشاقی یا فرم سیستمیک ضعیف تر به دلیل ناکارآمدی احتمالی آدرنال یا محرومیت از استروئید (مانند افزایش علائم حساسیتی) پایش و احتیاط کرد.

-این موارد پایش شود: اثر بخشی دارو در کاهش انقباض برونژ ها در آسم، عملکرد کلیه در بیماران سالمند، اثرات سیستمیک کورتیکواسترۆئید یا پاسخ ناکافی آدرنال، خطر کاهش مواد معدنی استخوان ها، تجمع بودزناید در بیماران با بیماری کبدی، کاندیدیازیس موضعی دهان و حلق (دوره ای).

• منابع:

- 1-GINA, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023 update.
- 2- NIH Asthma Guidelines
- 3- Uptodate, Budesonide (oral inhalation): Drug information