

آسیب کبدی ناشی

از دارو



مصرف خودسرانه داروها و زیاده روی در مصرف دمنوش‌ها و داروهای گیاهی می‌تواند عوارض جدی برای کبد به همراه داشته باشد.

- شیوع جهانی آسیب کبدی ناشی از دارو سالانه بین ۱۴ تا ۱۹.۱ در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر است.
- آسیب کبدی ناشی از دارو (DILI) و آسیب کبدی ناشی از گیاهان دارویی (HILI) از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می‌تواند به نارسایی حاد کبد، زردی و حتی مرگ منجر شود.
- این آسیب می‌تواند در اثر مصرف داروهای معمول، گیاهان دارویی و مکمل‌های تغذیه‌ای رخ دهد.
- تشخیص آسیب کبدی ناشی از دارو و گیاهان دارویی، دشوار و نیازمند دریافت سابقه دقیق دارویی و رد کردن دیگر علل احتمالی آسیب کبدی است.
- بسیاری از بیماران با آسیب کبدی ناشی از دارو بدون علامت هستند. برخی بیماران ممکن است دچار تب خفیف، بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ، درد در ربع فوقانی راست شکم، زردی یا ادرار تیره و خارش شوند.
- درمان اصلی آسیب کبدی ناشی از دارو، شناسایی و قطع داروی مسبب است. بنابراین نیاز است تا بیماران تمام داروهای مصرفی (اعم از داروهای نسخه ای، بدون نسخه، گیاهی، مکمل غذایی) و گیاهان دارویی را به کادر درمان اطلاع دهند.

